

古代经典名方“桑白皮汤”等 11 首经典名方关键信息表

57. 桑白皮汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 (明·张景岳)	桑白皮 半夏 苏子 杏仁 贝母 山栀 黄芩 黄连各八分 上, 水二盏, 姜三片, 煎八分, 温服。	桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮	生品	3.00 g	用水 400 mL, 煎至 320 mL 温服, 1 日 1-3 次。	【功效】清热化痰, 降肺平喘。 【主治】痰热郁肺之喘证。症见喘咳气涌, 胸部胀痛, 痰多质黏色黄或夹血痰; 伴胸中烦闷, 身热有汗, 口渴而喜冷饮; 面赤咽干, 尿赤便秘; 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。
		半夏	天南星科半夏 <i>Pinellia ternate</i> (Thunb.) Berit. 干燥块茎	清半夏	3.00 g		
		紫苏子	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实	生品	3.00 g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	生品	3.00 g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎	生品	3.00 g		
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	3.00 g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	3.00 g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch. 的干燥根茎	生品	3.00 g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 新鲜根茎	生品	3.00 g		

备注	<p>1.据已发布的古代经典名方关键信息表（25首方剂），生姜的用量专家共识意见为：生姜1片约为1-3g，本方推荐生姜3g。</p> <p>2.折算剂量为一服用量，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定口服总量。</p>
----	--

59. 暖肝煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 (明·陈实功)	当归二、三钱，枸杞三钱，茯苓二钱，小茴香二钱，肉桂一、二钱，乌药二钱，沉香一钱，或木香亦可。 水一盅半，加生姜三、五片，煎七分，食远温服。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根。	生品	9.32g	以水 300 mL，煮取 210 mL，距餐前后约 2 小时服用。	【功效】暖肝温肾，行气止痛。 【主治】肝肾不足，寒凝肝脉证。睾丸冷缩，或小腹疼痛，疝气疼痛，畏寒喜暖，舌淡苔白，脉沉迟。
		枸杞	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实。	生品	11.19g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核。	生品	7.46g		
		小茴香	伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实。	生品	7.46g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮。	生品	5.60g		
		乌药	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kos-term. 的干燥块根。	生品	7.46g		
		沉香	瑞香科植物白木香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg 含有树脂的木材。	生品	3.73g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎。	生品	4.00		
备注	1.由于《景岳全书》暖肝煎原书所载暖肝煎组成“沉香一钱，或木香亦可”，可见方中沉香是首选药物，木香是沉香的替代品，后世医籍记载中也多载沉香，故建议经典名方的开发选择沉香入药。						

65. 托里消毒散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《外科正宗》 (明·陈实功)	人参、川芎、白芍、黄芪、当归、白术、茯苓、金银花各一钱，白芷、甘草、皂角针、桔梗各五分。 水二盅，煎八分，食远服。	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> 的干燥根	生品	3.73g	以水 400 mL，煮取 320 mL，距餐前后约 2 小时服用。 1 日 1-3 次。	【功效】托里消毒，去腐生新。 【主治】治痈疽已成不得内消者，宜服此药以托之，未成者可消，已成者即溃，腐肉易去，新肉易生。
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎。	生品	3.73g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> 的干燥根	生品	3.73g		
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> var. <i>mongholicus</i> 的干燥根	生品	3.73g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> 的干燥根	生品	3.73g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> 的干燥根茎	生品	3.73g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> 的干燥菌核	生品	3.73g		
		金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> 的干燥花蕾或带初开的花	生品	3.73g		
		白芷	伞形科植物杭白芷 <i>A. dahurica</i> var. <i>formosana</i> 的干燥根	生品	1.87g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>G. uralensis</i> 的干燥根和根茎	生品	1.87g		

		皂角针	豆科植物皂荚 <i>G. sinensis</i> 的干燥棘刺	生品	1.87g	
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> 的干燥根	生品	1.87g	
备注	折算剂量为一服用量，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。					

66. 清上蠲痛汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《寿世保元》 (明·龚廷贤)	当归一钱(酒洗),小川芎一钱,白芷一钱,细辛三分,羌活一钱,独活一钱,防风一钱,菊花五分,蔓荆子五分,苍术一钱(米泔浸),片苓一钱五分(酒炒),麦门冬一钱,甘草三分(生)。上锉一剂,生姜煎服。	当归	为伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	3.73g	加生姜煎服。	【功效】疏风散邪,清热止痛。 【主治】治一切头痛,尤以风寒、风热、风湿所引起之头痛为佳,兼有表症者。
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	3.73g		
		白芷	伞形科植物杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.var.formosana (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根	生品	3.73g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag. 的干燥根和根茎	生品	1.12g		
		羌活	为伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	3.73g		
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim.f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	3.73g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	3.73g		

	菊花	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.的干燥头状花序	生品	1.87g
	蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham.的干燥成熟果实	生品	1.87g
	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.的干燥根茎	米泔水苍术	3.73g
	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	酒黄芩	5.60g
	麦门冬	百合科植物麦冬 <i>O. japonicus</i> 的干燥快根	生品	3.73g
	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.12g
备注	<p>1. 原文记载煎服法为“上锉一剂，生姜煎服”，未言加水量及具体服用方法，建议参考现行中药煎煮规范。</p> <p>2. 折算剂量为一服用量，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>			

68. 养胃汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《证治准绳》 (明·王肯堂)	半夏(汤洗七次)、厚朴(去粗皮、姜汁炒)、苍术(米泔浸一宿,洗切,炒)各一两,橘红七钱半,藿香叶(洗去土)、草果(去皮膜)、茯苓(去黑皮)、人参(去芦)各半两,炙甘草二钱半。 上咬咀,每服四钱,水一盞半,姜七片,乌梅一个,煎六分,热服。	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.的干燥根茎	米泔水苍术	4.00 g	上9味药物锉碎,加水450 mL与生姜、乌梅共煎至270 mL。饭前热服,一日1-3次。	【功用】养胃正阳,温中调气。 【主治】因脾胃虚弱导致的治外感风寒,内伤生冷,憎寒壮热,头目昏疼,肢体拘急等症,或头痛恶心,胸满呃呕等。
		人参	五加科人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	4.00 g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco. 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	4.00 g		
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	2.00 g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	2.00 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	2.00 g		
		草果	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire. 的干燥成熟果实	生品	2.00 g		
		藿香	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的叶片	生品	1.00 g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf. 的干燥菌核	生品	3.00 g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.	生品	7.00 g		

			的新鲜根茎		
	乌梅	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb.etZucc. 的干燥近成熟果实	生品	2.65 g	
备注	<p>1.折算剂量根据原文为每服剂量，一次一服。若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定每日服用次数，建议1日1-3次。</p> <p>2.根据专家共识意见，生姜1片约为1-3 g，乌梅一枚约2.65 g，因此本方每服生姜用量约为7 g，乌梅2.65 g。</p>				

70. 石决明散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《普济方》 (明·朱橚)	石决明 羌活(去芦头) 草决明 菊花(各一两) 甘草(炙锉半两) 上五味。捣罗为散,每服二钱匕,水一盏,煎至六分,和滓食后临卧温服。	石决明	杂色鲍 <i>H. diversicolor</i> 或皱纹盘鲍 <i>H. discus hannai</i> 的贝壳	生品	41.30g	上药捣碎为散,每服7.5g,加水300毫升,煎至180毫升,和滓,饭后睡前温服。 注:一次用量:每服7.5g(石决明、羌活、草决明、菊花各1.67g,炙甘草0.83g)建议日服3次。	【功效】平肝明目,祛风散邪,养阴退翳。 【主治】阴虚肝热,内有郁火。主治风毒气上攻,眼目昏暗,头目不利。多用于眼病、高血压病、头痛的治疗。
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	41.30g		
		决明子	豆科植物钝叶决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L.或决明(小决明) <i>Cassia tora</i> L.的干燥成熟种子	生品	41.30g		
		菊花	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.的干燥头状花序	生品	41.30g		
		甘草	豆科甘草属植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炙甘草	20.60g		

备注	<p>直接折算剂量并非每日服量。原文“和滓食后临卧温服”并未清晰说明一日的具体用量，仅言一次量为“每服二钱匕，水一盏，煎至六分，和滓”。据傅延龄等《论方寸匕、钱匕及其量值》，宋代1钱匕约为3.75g（本方原出处《圣济总录》）。故本方一次用量：每服7.5g（石决明、羌活、草明子、菊花各1.67g，炙甘草0.83g）。若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>
----	--

78. 益胃汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《温病条辨》 (清·吴瑭)	沙参三钱，麦冬五钱，冰糖一钱，细生地五钱，玉竹一钱五分（炒香）。水五杯，煮取二杯，分二次服，渣再煮一杯服。	沙参	伞形科植物珊瑚菜 <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根	生品	11.19g	以水 1000 mL，煮取 400mL，分两次服，余渣加水再煎煮至 200mL 服用。	【功用】养阴清热，益胃生津。 【主治】胃阴亏虚证，症见胃脘隐隐灼痛，咽干口燥，舌红或有裂纹，苔薄，脉细弦等。
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f)Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	18.65g		
		冰糖	砂糖经再溶、清净处理和重结晶而制得大颗粒结晶糖	单晶体冰糖 / 多晶体冰糖	3.73g		
		生地	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的新鲜或干燥块根	生品	18.65g		
		玉竹	玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 干燥根茎	炒玉竹	5.60g		
备注	本方每日的服药量为：沙参 11.19g，麦冬 18.65g，冰糖 3.73g，生地 18.65g，玉竹 5.60g。据原方中煎煮法“水五杯，煮取二杯，分二次服，渣再煮一杯服”，建议服用本方时，以上方药量煎煮，日分三次服。上述折算剂量系依清代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

82. 藿朴夏苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医原》（清·石寿棠）	杜藿香二钱，真川朴一钱，姜半夏钱半，赤苓三钱，光杏仁三钱，生薏仁四钱，白蔻末六分，猪苓钱半，淡香豉三钱，建泽泻钱半。选用丝通草三钱，或五钱煎汤代水，煎上药服。	藿香	唇形科植物藿香 <i>Agastache rugosa</i> 的干燥地上部分	生品	7.46g	以 14.92 g 通草煎汤代水，饭后温服，分 1-3 次服。	【功用】燥湿行气，芳化湿浊。 【主治】湿邪内停证，症见面色混浊油腻，口气浊腻，舌苔白腻，厚如积粉，脉息模糊不清，沉困嗜睡等。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	3.73g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	姜半夏	5.60g		
		赤茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核近外皮部淡红色部分	生品	11.19g		
		杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	生品	11.19g		
		薏苡	禾本科植物薏米 <i>Coix lacryma-jobi</i> L.var.ma-yuen(Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁	生品	14.92g		
		白豆蔻	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实	生品	2.24g		
		猪苓	多孔菌属真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核	生品	5.60g		
		淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr.的干燥成熟种子（黑豆）的发酵加工品	生品	11.19g		
		泽泻	泽泻科植物泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn.的干燥块茎	生品	5.60g		
		通草	五加科植物通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch 的干燥茎髓	生品	14.92g		

备注	<ol style="list-style-type: none">1. 本方每次的服药量为：藿香 7.46g，厚朴 3.73g，姜半夏 5.60g，赤茯苓 11.19g，杏仁 11.19g，薏苡 14.92g，白豆蔻 2.24g，猪苓 5.60g，淡香豉 11.19g，泽泻 5.60g，丝通草 14.92g。2. 原文记载煎服法为“选用丝通草三钱，或五钱煎汤代水，煎上药服”，未言加水量，建议参考现行中药煎煮规范。3. 上述折算剂量系依清代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。
----	--

90. 两地汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》 (清·傅山)	大生地一两(酒炒), 元参一两,白芍药五钱 (酒炒),麦冬肉五钱, 地骨皮三钱,阿胶三 钱。水煎服。	生地黄	Rehmannia glutinosa Libosch.的新鲜或干燥块根	酒地黄	37.3g	水煎服。	【功效】养阴清热,凉血调经。 【主治】月经先期 阴虚血热证。症见 经来先期,量少, 色红质稠,两颧潮 红,手足心热,咽 干口渴。舌红苔 少,脉细数。
		玄参	玄参科植物玄参 Scrophularia ningpoensis Hemsl.的干燥根	生品	37.3g		
		白芍	毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall.的干燥根	酒白芍	18.65g		
		麦冬	百合科植物麦冬 Ophiopogon japonicus(L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	18.65g		
		地骨皮	茄科植物枸杞 Lycium chinense Mill.或宁夏枸杞 Lycium barbarum L.的干燥根皮	生品	11.19g		
		阿胶	马科动物驴 Equus asinus L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	11.19g		
备注	1. 上述折算剂量系依清代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2. 原文记载煎服法为“水煎服”,未言具体煎煮方法,建议参考现行中药煎煮规范。						

91. 四妙勇安汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《验方新编》 (清·鲍相璈)	金银花、元参各三两， 当归二两，甘草一两， 水煎服。	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花	生品	111.9g	水煎服。	【功效】清热解毒，活血止痛。 【主治】热度炽盛之脱疽。症见患肢暗红，肿痛溃烂，甚则脚趾节节脱落，延及足背，发热口渴，舌红脉数。
		元参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl. 的干燥根	生品	111.9g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	74.6g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch 的干燥根和根茎	生品	37.3g		
备注	1. 上述折算剂量系依清代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2. 原文记载煎服法为“水煎服”，未言具体煎煮方法，建议参考现行中药煎煮规范。						

99. 清燥救肺汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医门法律》 (清·俞昌)	桑叶三钱（去枝梗），石膏二钱五分（煨），甘草一钱，人参七分，胡麻仁一钱（炒，研），真阿胶八分，麦门冬一钱二分（去心），杏仁七分（炮，去皮尖，炒黄），枇杷叶一片（刷去毛，蜜涂炙黄）。水一碗，煎六分，频频二三次滚热服。	桑叶	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥叶	生品	11.19 g	以水 300ml，煎 至180ml， 分2-3次 服。	【功效】清燥润肺，益气养阴。 【主治】温燥伤肺证。症见身热头痛，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，胸满胁痛，心烦口渴，舌干少苔，脉虚大而数。
		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）	煨石膏	9.33 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73 g		
		人参	五加科人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	2.61 g		
		胡麻仁	脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L.的干燥成熟种子	炒胡麻仁	3.73 g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	2.98 g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	4.48 g		
		杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的	炒苦杏仁	2.61 g		

			干燥成熟种子		
	枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.的干燥叶	蜜炙	3.73 g	
备注	1.上述折算剂量系依清代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。				

说明：本考证结果仅供参考，最终以国家中医药管理局公布为准。